

Instructies voor het vullen van vacutainer urinebuizen

Wat heeft u nodig?

- Een schoon potje om uw plas in op te vangen.
- Een buisje (vacutainer) voor uw plas.

Waar moet u op letten?

- Zorg ervoor dat er geen poep bij de plas komt
- In het buisje met de hele gele dop mag geen bloed bij de plas komen. Als u ongesteld bent, kunt u het beste wachten met plas opvangen tot na uw menstruatie
- Als u chemotherapie heeft gehad, wacht dan ongeveer 7 dagen voordat u plas verzamelt. Als u toch eerder plas moet verzamelen, schrijf dan "cytostatica" op het aanvraagformulier en op het buisje.
- Schrijf uw naam en geboortedatum op het buisje.
- Schrijf ook de tijd op wanneer u geplast heeft en de plas in het buisje doet.

Urinebuis inleveren

Breng het buisje met de plas naar de bloedafnamepoli of een prikpost van het laboratorium bij u in de buurt.

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
(0478) 52 22 22

Hoe u het doet



De rode lijn op het buisje laat zien hoe vol het buisje met de hele gele dop mag zijn. Zorg ervoor dat dit buisje tot de rode lijn gevuld wordt. Het buisje met een gele dop en een zwarte binnenkant moet helemaal vol.

e



Hoe u het doet

Doe eerst het puntje van het overzetrietje in de urine. Daarna drukt u het buisje op de houder van het overzetrietje. Blijf het zo vasthouden totdat het buisje genoeg urine bevat. Haal dan het buisje van de houder af.